

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## СПАСКУПРЕЛЬ® (Spascupreel®)

### Регистрационный номер:

ЛП-№(000487)-(РГ-RU)

### Торговое наименование :

Спаскупрель®

### Лекарственная форма

Таблетки подъязычные гомеопатические.

### Состав (на 1 таблетку):

*Активные компоненты:* Citrullus colocynthis (Цитруллин колоцинтис) D4 30 мг, Ammonium bromatum (Аммоний броматум) D4 30 мг, Atropinum sulfuricum (Атропинум сульфурikum) D6 30 мг, Veratrum album (Вератрум альбум) D6 30 мг, Magnesium phosphoricum (Магний фосфорikum) D6 30 мг, Gelsemium sempervirens (Гельземиум семпервиренс) D6 30 мг, Passiflora incarnata (Пассифлора инкарната) D2 15 мг, Amanita muscaria (Аманита мускария) D4 15 мг, Chamomilla recutita (Хамомилла рекутита) D3 15 мг, Cuprum sulfuricum (Купрум сульфурikum) D6 15 мг, Aconitum napellus (Аконитум напеллус) D6 60 мг;  
*Вспомогательные вещества:* магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 302 мг.

### Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого до желтовато-белого цвета, иногда с желтыми, желтовато-коричневыми или черными вкраплениями. Запах практически отсутствует.

### Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство.

### Фармакологические свойства

#### *Фармакодинамика*

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

#### *Фармакокинетика*

Не применимо.

### Показания к применению

Спастический болевой синдром (спазмы желудка, кишечника, желчного пузыря, мочевыводящих путей); спазмы поперечно-полосатой мускулатуры (мышечная ригидность, мышечное напряжение).

### Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к растениям семейства астровых (Asteraceae), детский возраст до 3 лет (в связи с недостаточностью клинических данных), непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

### Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для

плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Способ применения и дозы**

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.

Курс терапии - 2-3 недели, по указанию врача продолжительность лечения может быть увеличена.

Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача. Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует сообщить об этом врачу.

### **Передозировка**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Назначение препарата Спаскупрель® не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

### **Особые указания:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу. В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не следует назначать пациентам с непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией. Применение препарата у детей старше 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.

Указание для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке соответствует 0,025 ХЕ.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

### **Форма выпуска**

Таблетки подъязычные гомеопатические. По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. Каждый пенал вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности:**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмБХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

**Организация, принимающая претензии потребителей:**

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,

Ленинградский проспект, 15, стр. 12

Телефон: +7 (495) 937-78-25

E-mail: [info@heel-russia.ru](mailto:info@heel-russia.ru)