



# ТРАУМЕЛЬ® С

# Traumeel<sup>s</sup>®

**Регистрационный номер** ЛП-№(000264)-(РГ-RU)

**Торговое наименование**

Траумель® С

**Лекарственная форма**

Мазь для наружного применения гомеопатическая

**Состав** (на 100 г препарата):

*Активные компоненты:* Arnica montana (Арника монтана) D3 1,5 г, Calendula officinalis (Календула оффициналис) Ø 0,45 г, Hamamelis virginiana (Гамамелис виргиниана) Ø 0,45 г, Echinacea (Эхинацея) Ø 0,15 г, Echinacea purpurea (Эхинацея пурпурная) Ø 0,15 г, Chamomilla recutita (Хамомилла рекутита) Ø 0,15 г, Symphytum officinale (Симфитум оффицинале) D4 0,1 г, Bellis perennis (Беллис переннис) Ø 0,1 г, Hypericum perforatum (Гиперикум перфоратум) D6 0,09 г, Achillea millefolium (Ахиллея миллефолиум) Ø 0,09 г, Aconitum napellus (Аконитум напеллус) D1 0,05 г, Atropa bella-donna (Атропа белла-донна) D1 0,05 г, Mercurius solubilis Hahnemanni (Меркуриус растворимый Ганемани) D6 0,04 г, Nepar sulfuris (Непар сульфурис) D6 0,025 г;

*Вспомогательные вещества:*

парафин жидкий 9,342 г, цетостеариловый спирт (тип А) эмульгирующий 8,007 г, парафин белый мягкий 9,342 г, вода очищенная 60,579 г, этанол (этиловый спирт) 96 % (по объёму) 9,335 г.

**Описание**

Мазь от белого до желтовато- или розовато-белого цвета, со слабым, характерным запахом, не должно ощущаться прогорклого запаха. Однородная, без следов физической нестабильности (агрегации частиц, фазового расслоения, коагуляции).

**Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатическое средство

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

**Фармакокинетика**

Не применимо.

**Показания к применению**

В комплексной терапии воспалительных заболеваний различных органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит и др.) и посттравматических состояний (отек мягких тканей после операции, вывихов, растяжений).

**Противопоказания**

- Гиперчувствительность к активным компонентам, и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе «Состав».
- Известная гиперчувствительность к Тысячелистнику обыкновенному (Achillea millefolium), Ромашке аптечной (Chamomilla recutita), Ноготкам лекарственным (Calendula officinalis), Маргаритке многолетней (Bellis perennis), Эхинацеи (Echinacea), Арники горной (Arnica montana) или иным растениям семейства сложноцветных.
- Известная гиперчувствительность к эмульгирующему цетилстеариловому спирту.
- Туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянный склероз, синдром приобретенного иммунного дефицита, вирус иммунодефицита человека и другие аутоиммунные заболевания.
- Детский возраст до 3 лет в связи с недостаточностью клинических данных.



**-Heel**





## **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

## **Способ применения и дозы**

Если не прописано иначе, детям от 3 лет и взрослым достаточное количество мази наносить тонким слоем на кожу болезненных областей тела и втирать легкими движениями 2-3 раза в день. Возможно наложение мазевой повязки. Курс лечения при посттравматических состояниях - 2 недели и более; при воспалительных заболеваниях - не менее 3-4 недель.

## **Побочное действие**

При применении мази в отдельных случаях могут наблюдаться реакции повышенной чувствительности (кожные аллергические реакции). При обнаружении побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

## **Передозировка**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

## **Особые указания**

1. Для повышения эффективности лечения рекомендуется прием различных лекарственных форм Траумель® С, например, мази, капель или таблеток и раствора для внутримышечного и околосоуставного введения.

2. При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При нарушении кожных покровов и кожных заболеваниях, мазь следует применять после консультации с врачом.

Тубу следует закрывать сразу после применения препарата.

## **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

## **Форма выпуска**

Мазь для наружного применения гомеопатическая. По 50 г или 100 г в тубу из алюминия с внутренним покрытием из эпоксифенольного пластика и внешним покрытием из белого полиэфирного лака, с защитной мембраной из алюминиевой фольги на горлышке и укупоренную завинчивающимся колпачком из пропилена. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

## **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

## **Срок годности**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

## **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

## **Производитель**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмБХ  
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден,  
Германия

## **Организация, принимающая претензии потребителей:**

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,  
Ленинградский проспект, 15, стр. 12  
Телефон: +7 (495) 937-78-25  
E-mail: info\_russia@heel.com

