

Angin-Heel_{SD}

Ангин-Хель СД

Регистрационный номер и дата ЛП-№(000217)-(РГ-RU)

Торговое наименование: Ангин-Хель СД

Лекарственная форма: Таблетки для рассасывания гомеопатические.

Состав (на 1 таблетку):
Активные компоненты: Hydrargyrum bicyanatum (Гидраргирум бицианатум) D8 30 мг, Phytolacca americana (Фитолякка американа) D4 30 мг, Apis mellifica (Апис мelliфика) D4 30 мг, Arnica montana (Арника монтана) D4 30 мг, Hepar sulfuris (Гепар сульфурис) D6 60 мг, Atropa bella-donna (Атропа белла-донна) D4 60 мг;
Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 0,302 г.

Описание: Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы, с фаской, от белого до желтовато-белого цвета, иногда с отдельными желтоватыми или сероватыми вкраплениями, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика:

Не применимо.

Показания к применению: Тонзиллит.

Противопоказания:

- Гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе «Состав».
- Известная гиперчувствительность к растениям семейства Астровых (Сложноцветных).
- Детский возраст до 3 лет.
- Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания: В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Способ применения и дозы: Взрослые и дети старше 12 лет принимают препарат по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды или спустя 1 час после приема пищи. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания.
При обострениях принимают по 1 таблетке каждые полчаса или час (но не более 12 таблеток в день).
Длительность применения препарата, в зависимости от выраженности симптомов заболевания, составляет от 7-10 дней до 3-4 недель. Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.
Применение препарата у детей от 3 до 12 лет возможно по назначению и под контролем врача.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. После применения препарата Ангин-Хель СД может наблюдаться увеличение слюноотделения; прием препарата в этом случае следует прекратить.

Передозировка: При приеме больших количеств данного лекарственного средства могут наблюдаться диспептические явления, обусловленные наличием в его составе лактозы.

Взаимодействие с другими препаратами: Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания: При рецидивирующих воспалительных заболеваниях миндалин и устойчивой (в течение более 3 дней) повышенной температуре тела или при ее повышении выше 39 °С, а также при всех неясных или устойчивых симптомах следует обратиться к врачу.
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.
Информация для пациентов с сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами: Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. Каждый пенал вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности: 5 лет.
Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия хранения: В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска:
Отпускают без рецепта.

Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей
ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва,
Космодамианская набережная, 52, стр. 3
Телефон: (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru