

Дуоденохель®

Duodenoheel®

Регистрационный номер

ЛП-№(001731)-(РГ-RU)

Торговое наименование:

Дуоденохель®

Лекарственная форма

Таблетки для рассасывания гомеопатические

Состав (на 1 таблетку):

*Активные компоненты:* Semecarpus anacardium (Семекарпус анакардиум) D4 30 мг, Argentum nitricum (Аргентум нитрикум) D6 30 мг, Cephaelis ipecacuanha (Цефалис ипекакуана) D4 30 мг, Iodum (Иодум) D6 30 мг, Lachesis mutus (Лажезис мутус) D12 60 мг, Petroleum rectificatum (Петролеум ректификатум) D6 60 мг, Robinia pseudoacacia (Робиния псеудоакация) D4 60 мг;  
*Вспомогательные вещества:* магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 301,5 мг.

Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого до желтовато-белого цвета, иногда с желтоватыми или сероватыми вкраплениями; без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

**Фармакодинамика**

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

**Фармакокинетика**

Не применимо.

Показания к применению

Препарат применяют в комплексной терапии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, гастродуоденита, гастрита с повышенной кислотностью.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности, к йоду, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 таблетке 3 раза в день за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Курс лечения - 3-4 недели. При необходимости курс лечения можно повторить после консультации с врачом. В период обострений принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае, а также при появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

При заболеваниях щитовидной железы препарат следует принимать только после консультации с врачом.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 ХЕ.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не следует назначать пациентам с непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

**Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. На каждый пенал наклеивают этикетку. Каждый пенал вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности**

5 лет.  
Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
Др.-Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

**Наименование и адрес держателя регистрационного удостоверения**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
Др.-Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

**Организация, принимающая претензии потребителей:**

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,  
Ленинградский проспект, 15, стр. 12  
Телефон: +7 (495) 937-78-25  
E-mail: info\_russia@heel.com