Энгистол®

таблетки подъязычные гомеопатические

Активные компоненты: Vincetoxicum hirundinaria, Sulfur.

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к лечащему врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Энгистол®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Энгистол®.
3. Прием препарата Энгистол®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Энгистол®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Энгистол®, и для чего его применяют

Лекарственный препарат Энгистол® – это многокомпонентный гомеопатический лекарственный препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

Препарат применяется у взрослых пациентов и детей с 3 до 18 лет в комплексной терапии простудных заболеваний и гриппозных состояний (лихорадка, общая слабость, головная боль, насморк) в качестве средства, активирующего неспецифические защитные механизмы организма.
Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, следует обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Энгистол®

Противопоказания

Не принимайте препарат Энгистол®:

– если у Вас аллергия (повышенная индивидуальная чувствительность) к активным компонентам, и/или к любым другим компонентам препарата (перечисленным в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Энгистол® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При приеме гомеопатических лекарственных препаратов могут временно обостряться симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных эффектов, не описанных в листке-вкладыше, следует сообщить об этом врачу.

Дети и подростки

Особенности дозирования приведены в разделе 3.

Не давайте препарат Энгистол® детям в возрасте от 0 до 3-х лет, поскольку эффективность и безопасность у детей в возрасте от 0 до 3-х лет не установлены.

Другие препараты и препарат Энгистол®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы или Ваш ребенок принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает применение других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Применение лекарственного препарата Энгистол® при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риски для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата Энгистол® не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Препарат Энгистол® содержит лактозу

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы (ХЕ).

При приеме гомеопатических лекарственных препаратов могут временно обостряться симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных эффектов, не описанных в листке-вкладыше, следует сообщить об этом врачу.

Дети и подростки

Особенности дозирования приведены в разделе 3.
Не давайте препарат Энгистол® детям в возрасте от 0 до 3-х лет, поскольку эффективность и безопасность у детей в возрасте от 0 до 3-х лет не установлены.

Другие препараты и препарат Энгистол®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы или Ваш ребенок принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает применение других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Применение лекарственного препарата Энгистол® при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риски для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Применение препарата Энгистол® не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Препарат Энгистол® содержит лактозу

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.
Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы (ХЕ).

3. Прием препарата Энгистол®

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Взрослые
По 1 таблетке 3 раза в день.
При обострениях принимают по 1 таблетке каждые полчаса – час (не более 6 раз в сутки).

Применение у детей и подростков
Дети старше 12 лет: режим дозирования совпадает с режимом дозирования у взрослых пациентов.
Дети от 6 до 12 лет: при хроническом течении заболевания - по 2/3 таблетки 1-3 раза в день. При обострениях принимают по 2/3 таблетки каждые полчаса - час (не более 6 раз в сутки).
Дети от 3 до 6 лет: при хроническом течении заболевания по 1/2 таблетки 1-3 раза в день. При обострениях принимают по 1/2 таблетки каждые полчаса - час (не более 6 раз в сутки).
Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.

Путь и (или) способ введения
Внутрь.
Держать таблетку во рту до полного рассасывания.
Способ получения раствора для применения препарата у детей:
Дети от 6 до 12 лет: растворяют 1 таблетку в приблизительно 150 мл воды. Дают ребенку 2/3 полученного раствора, остальное выливают.
Дети от 3 до 6 лет: растворяют 1 таблетку в приблизительно 150 мл воды. Дают ребенку 1/2 полученного раствора, остальное выливают.

Продолжительность терапии
Лекарственный препарат можно принимать без консультации с врачом не более одной недели.

Если Вы приняли препарата Энгистол® больше, чем следовало
Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы. Если Вы или Ваш ребенок приняли препарат Энгистол® больше, чем следовало, сообщите об этом лечащему врачу.

Если Вы забыли принять препарат Энгистол®
Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.
При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Энгистол® может вызывать нежелательные реакции, однако, они возникают не у всех.
Сообщите врачу, если у Вас возникнут любые признаки возможных нежелательных реакций, частота возникновения которых неизвестна (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):
- аллергические реакции.

Сообщение о нежелательных реакциях
Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1
Телефон: +7 800 550 99 03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://www.roszdravnadzor.gov.ru/

5. Хранение препарата Энгистол®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и пенале после «Годен до...».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Энгистол® содержит:

Действующими веществами являются: Vincetoxicum hirundinaria (винцетоксикум гирундинария) и Sulfur (сульфур).

Каждая таблетка содержит: 75 мг Vincetoxicum hirundinaria (винцетоксикум гирундинария) D6, 75 мг Vincetoxicum hirundinaria (винцетоксикум гирундинария) D10, 75 мг Vincetoxicum hirundinaria (винцетоксикум гирундинария) D30, 37,5 мг Sulfur (сульфур) D4, 37,5 мг Sulfur (сульфур) D10.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются магния стеарат, лактозы моногидрат.

Препарат Энгистол® содержит лактозу (см. раздел 2).

Внешний вид Энгистол® и содержимое упаковки

Таблетки подъязычные гомеопатические.

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого до желто-белого цвета. Без запаха или со слабым сладковатым запахом.

По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. На каждый пенал наклеивают этикетку. Каждый пенал вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

5. Хранение препарата Энгистол®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.
Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и пенале после «Годен до...».
Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.
Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.
Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Энгистол® содержит:

Действующими веществами являются: Vincetoxicum hirundinaria (винцетоксикум гирундинария) и Sulfur (сульфур).
Каждая таблетка содержит: 75 мг Vincetoxicum hirundinaria (винцетоксикум гирундинария) D6, 75 мг Vincetoxicum hirundinaria (винцетоксикум гирундинария) D10, 75 мг Vincetoxicum hirundinaria (винцетоксикум гирундинария) D30, 37,5 мг Sulfur (сульфур) D4, 37,5 мг Sulfur (сульфур) D10.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются магния стеарат, лактозы моногидрат.
Препарат Энгистол® содержит лактозу (см. раздел 2).

Внешний вид Энгистол® и содержимое упаковки

Таблетки подъязычные гомеопатические.
Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого до желто-белого цвета. Без запаха или со слабым сладковатым запахом.
По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. На каждый пенал наклеивают этикетку. Каждый пенал вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Германия
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден
тел.: +49 7221 501 00
адрес электронной почты: info@heel.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация
ООО «Хеель Рус»
125040, Москва, Ленинградский проспект, 15, стр. 12
тел.: +7 (495) 937-78-25
адрес электронной почты: info_russia@heel.com

Листок-вкладыш пересмотрен
10/2025

Прочие источники информации
Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза
http://eec.eaeunion.org/