Ангин-Хель СД

таблетки для рассасывания гомеопатические

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда принимайте препарат в точном соответствии с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
Если состояние не улучшается после 7 дней лечения или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что представляет собой препарат Ангин-Хель СД и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Ангин-Хель СД.
3. Прием препарата Ангин-Хель СД.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Ангин-Хель СД.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕПАРАТ АНГИН-ХЕЛЬ СД, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Лекарственный препарат Ангин-Хель СД – это многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

Лекарственный препарат Ангин-Хель СД применяется при тонзиллите.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА АНГИН-ХЕЛЬ СД

Противопоказания

Не применяйте препарат Ангин-Хель СД:

- если у Вас гиперчувствительность к активным веществам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша;
- если у Вас известная гиперчувствительность к растениям семейства Астровых (Сложноцветных);
- у детей младше 3 лет;
- если у Вас непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Ангин-Хель СД проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

При рецидивирующих воспалительных заболеваниях миндалин и устойчивой (в течение более 3 дней) повышенной температуре тела или при ее повышении выше 39 °С, а также при всех неясных или устойчивых симптомах обратитесь к врачу.

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в листке-вкладыше, обратитесь к врачу.

Дети и подростки

Применение препарата у детей от 3 до 12 лет возможно по назначению и под контролем врача.

Другие препараты и препарат Ангин-Хель СД

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Случаи взаимодействия не описаны и не ожидаются в связи с гомеопатическим разведением активных компонентов. Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Лекарственный препарат Ангин-Хель СД не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Препарат Ангин-Хель СД содержит лактозы моногидрат

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.

3. ПРИЕМ ПРЕПАРАТА АНГИН-ХЕЛЬ СД

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза
Взрослые
Стандартная доза:
По 1 таблетке 3 раза в день.
Начальная доза или доза при острых состояниях:
По 1 таблетке каждые полчаса или час (но не более 12 таблеток в день).
Применение у детей и подростков
Стандартная доза:
Детям старше 12 лет: по 1 таблетке 3 раза в день.
Начальная доза или доза при острых состояниях:
По 1 таблетке каждые полчаса или час (но не более 12 таблеток в день).

Путь и (или) способ введения
Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Препарат следует принимать за 30 мин до еды или спустя 1 час после приема пищи.

Продолжительность терапии
Длительность применения препарата, в зависимости от выраженности симптомов заболевания, составляет от 7-10 дней до 3-4 недель. Проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом.

Если Вы приняли препарата Ангин-Хель СД больше, чем следовало
При приеме больших количеств препарата могут наблюдаться диспептические явления, обусловленные наличием в его составе лактозы. Если Вы или Ваш ребенок приняли препарата Ангин-Хель СД больше, чем следовало, сообщите об этом лечащему врачу.

Если Вы забыли принять препарат Ангин-Хель СД
Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам, данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.
Возможны аллергические реакции. После применения препарата Ангин-Хель СД может наблюдаться увеличение слюноотделения; прием препарата в этом случае следует прекратить.

Сообщение о нежелательных реакциях
Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.
Российская Федерация
Адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Тел.: +7 (495) 698-45-38, +7 (499) 578-02-30
Факс: +7 (495) 698-15-73

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.ru
Интернет-сайт: www.roszdravnadzor.ru

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АНГИН-ХЕЛЬ СД

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.
Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и пенале после слов «Годен до:.».
Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.
Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.
Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Ангин-Хель СД содержит:
Каждая таблетка содержит:

Hydrargyrum bicyanatum (Гидраргирум бицианатум) D8	30 мг
Phytolacca americana (Фитолякка американа) D4	30 мг
Apis mellifica (Апис меллифика) D4	30 мг
Arnica montana (Арника монтана) D4	30 мг
Hepar sulfuris (Гепар сульфурис) D6	60 мг
Atropa bella-donna (Атропа белла-донна) D4	60 мг

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются лактозы моногидрат и магния стеарат.

Внешний вид препарата Ангин-Хель СД и содержимое упаковки
Таблетки для рассасывания гомеопатические.
Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы, с фаской, от белого до желтовато-белого цвета, иногда с отдельными желтоватыми или сероватыми вкраплениями, без запаха.
По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. Каждый пенал вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия
Тел.: +49 7221 501 00
Факс: +49 7221 501 210
Электронная почта: info@heel.com

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация
ООО «Хеель Рус»
125040, Москва, Ленинградский проспект, 15, стр. 12
Тел.: +7 (495) 937-78-25
Электронная почта: info@heel-russia.ru

Листок-вкладыш пересмотрен
01/2022